

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ботаники и защиты леса

А.П. Петров

ДЕНДРОЛОГИЯ

Методические указания
для лабораторных занятий
студентов очной формы обучения
специальностей 250100, 250201 и 250203.
Дисциплина «Дендрология»

Екатеринбург
2010

Печатается по рекомендации методической комиссии ЛХФ.
Протокол №1 от 30 сентября 2008 г.

Рецензент – канд. биологических наук доцент Е.А. Зотева

Редактор Р.В. Сайгина
Оператор Г.И. Романова

Подписано в печать 08.04.10.		Поз. 65
Плоская печать	Формат 60x84 1/16	Тираж 150 экз.
Заказ №	Печ. л. 2,56	Цена 13 руб. 24 коп.

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

ВВЕДЕНИЕ

Специалисты лесного хозяйства и садово-паркового и ландшафтно-го строительства должны знать дендрологию в объеме, необходимом для решения как производственных, так и проектных задач. А для этого им необходимы знания морфологии древесных растений, их внутривидовой изменчивости, экологии и географии. Они должны свободно различать виды и формы древесных растений в облиственном и безлистном состоянии по общему виду (габитусу) кроны, по коре стволов и ветвей, по морфологическому строению цветков, шишек, плодов, семян, всходов, должны уметь пользоваться определителями.

Данные методические указания предполагают, учитывая большой объем программы курса «Дендрология» и малое время, отводимое для его проработки, изучение видов древесных растений с разной степенью детализации. Наиболее подробно рассматриваются основные лесообразующие виды, для которых дается детальная комплексная характеристика.

Каждая отдельная тема рассчитана как на рассмотрение на лабораторных занятиях, так и на самостоятельную работу студентов. Лабораторная работа 12 «Определение видов древесных растений по побегам в безлистном состоянии» может быть целиком выделена как самостоятельная.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ (*Pinophyta*, или *Gymnospermae*)

Все древесные растения относятся к двум отделам растительного мира: голосеменным и покрытосеменным.

Современные голосеменные включают четыре класса растений: саговниковые (*Cycadopsida*), гинкговые (*Ginkgoopsida*), гнетовые (*Gnetopsida*) и хвойные (*Pinopsida*). Из них наиболее широко распространены хвойные, главным образом представители семейства сосновых (*Pinaceae*).

Сосновые – одна из наиболее важных групп древесных растений как в лесном хозяйстве нашей страны, так и в озеленении.

Это однодомные деревья с раздельнополыми стробилами (колосками), моноподиальным типом ветвления и игловидной хвоей. В зависимости от ряда морфологических особенностей (наличия укороченных побегов, характера расположения хвои, стробилов) в семействе выделяют три трибы: лиственничные, сосновые и пихтовые.

Лиственничные (роды *Larix* и *Cedrus*) имеют как удлиненные, так и укороченные побеги. Хвоя располагается одиночно спирально на удлиненных побегах и пучками на укороченных. Мега- и микростробилы (женские и мужские колоски) располагаются на укороченных побегах. Семена созревают у лиственниц в год опыления, а у кедров – на второй-третий год.

Сосновые (род *Pinus*), как и лиственничные, имеют удлиненные и укороченные побеги. Ассимилирующая хвоя образуется только на укороченных побегах в определенном для каждого вида количестве (по 2-3-5, реже по 1 или 6-8). Одиночное расположение зеленой хвои на осевом побеге характерно лишь для однолетних растений. Мега- и микростробилы располагаются на молодых весенних побегах. Оплодотворение у сосен происходит лишь весной следующего после опыления года, поэтому период созревания шишек охватывает 2, реже 3 года. Шишки сосен имеют деревянистые, сильно прилегающие друг к другу семенные чешуи, с характерным сильно утолщенным щитком (апофизом) с пупком в центре или с наружного края.

Пихтовые (роды *Abies*, *Picea*, *Tsuga*, *Pseudotsuga*) отличаются наличием только удлиненных побегов с одиночно расположенной хвоей. Мега- и микростробилы образуются на побегах прошлого года. Семена созревают в год опыления.

Лабораторная работа 1

Морфологические и экологические особенности видов семейства Сосновые (Pinaceae)

Материал: гербарные образцы весенних, летних и зимних побегов, зрелые шишки, семена, гербарные образцы всходов, образцы древесины и коры, препараты мужских и женских колосков (стробилов), хвои.

Задание 1. Изучить и описать морфологические и экологические особенности лиственницы Сукачева (*Larix sukaczewii*), сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*), ели сибирской (*Picea obovata*) и пихты сибирской (*Abies sibirica*).

Описание в альбоме или на специальном бланке произвести по ниже приведенной схеме.

Побеги:

- тип нарастания,
- расположение,
- тип,
- опушенность,
- размер годичного прироста.

Почки:

- форма и размер,
- засмоленность.

Хвоя:

- расположение,
- наличие подушечек,
- размер и внешняя форма,
- форма поперечного сечения.

Мужские колоски:

- расположение,
- форма и размер.

Женские колоски:

- расположение,
- форма и размер,
- кроющие чешуи и семенные чешуи,
- семяпочки.

Зрелые шишки:

- форма и размер,
- характер прикрепления,
- характер раскрытия шишки,
- форма семенной и кроющей чешуи.

Семена:

- форма и размер,
- форма и размер крыла,
- способ прикрепления крыла.

Всходы:

- размер,
- количество семядолей.

Форма, толщина, цвет коры.

Тип и качество древесины.

Роль в лесообразовании.

Экологические особенности.

Ареал.

Хозяйственное значение.

Задание 2. Зарисовать охвоенные удлиненные и укороченные побеги, хвоинку и её поперечное сечение, мужские и женские колоски, семенные и кроющие чешуи зрелой шишки, семена и всходы. Обратить внимание на величину кроющих чешуй в женском колоске и зрелой шишке.

Задание 3. На контурную карту нанести границы ареалов изученных видов.

Задание 4. Самостоятельно провести сравнение морфологических особенностей сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*) и кедра сибирского (*Pinus sibirica*) по следующей форме:

Признаки и свойства	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Pinus sibirica</i>
Число хвоинок в пучке		
Форма поперечного сечения хвои		
Число проводящих пучков в хвое		
Строение шишек; форма апофиза, пупка семенных чешуй		
Строение семян		
Условия произрастания		
Качество древесины		

Лабораторная работа 2

Определение видов хвойных по шишкам

Материал: шишки различных видов хвойных.

Задание 1. Определить с помощью ключа виды хвойных по шишкам.

Задание 2. Зарисовать в альбоме общие очертания шишек, строение их семенных и кроющих чешуй. Обратить внимание на размеры кроющих чешуй в шишках разных видов.

Задание 3. Сделать описание видов хвойных и их шишек по следующей схеме:

- русское и латинское название вида,
- форма и размер шишки,
- цвет шишки,
- строение семенных и кроющих чешуй,
- наличие опушения на семенных чешуйках,
- роль в лесообразовании и экологические особенности вида,
- ареал вида,
- хозяйственное значение вида.

Задание 4. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ к определению видов хвойных по шишкам

1. Зрелые шишки ягодообразные черно-синего цвета с голубоватым налетом. Семенные чешуйки мясистые, сросшиеся между собой. Размер шишкоягод от 0,6 до 1 см. Мякоть желтовато-бурого цвета, смолистая, сладкая.

Можжевельник обыкновенный – *Juniperus communis*

- Зрелые шишки деревянистые.....2
- 2. Семенные чешуи шишек располагаются супротивно накрест.....3
 - Семенные чешуи шишек располагаются очередно, спирально.....4
- 3. Шишки округлые, 20-30 мм в диаметре, состоят из 6-8 выпуклых щитовидных чешуй, снабженных небольшими отростками.

Кипарис вечнозеленый – *Cupressus sempervirens*

- Шишки яйцевидно-продолговатые, длиной 10-15 мм, состоят из 3-4 (5-6) пар кожисто-деревянистых чешуй.

Туя западная – *Thuja occidentalis*

- 4. Семенные чешуи шишек на конце имеют утолщенный щиток, апофиз.....5
 - Семенные чешуи шишек без апофиза.....13
- 5. Апофиз семенных чешуй заканчивается пупком.....6
 - Апофиз имеет форму более или менее правильного ромба или пирамидки с пупком по середине.....9
- 6. Шишки раскрывающиеся. Апофиз ногтевидной формы.....7
 - Шишки нераскрывающиеся. Семенные чешуи лотковидной формы.....8

7. Шишки веретеновидные, слегка изогнутые, длиной 10-15 см. Окраска апофиза и основания чешуи мало отличаются. В раскрытой шишке чешуи отходят под острым углом.

Сосна веймутова – *Pinus strobus*

– Шишки более широкие, цилиндрические. Семенные чешуи в раскрытой шишке отходят почти под прямым углом. Апофиз и основание чешуи отличаются по окраске.

Сосна румелийская, балканская – *Pinus peuce*

8. Шишки крупные, 12-16 см длиной. Конец семенной чешуи клиновидно заостренный, с отогнутой наружу верхушкой (шишки «рогатые»).

Сосна кедровая корейская (кедр корейский) – *Pinus koraiensis*

– Шишки широкояйцевидные. Длина до 13 см, ширина 4-6 см. Широкий ромбический апофиз заканчивается светлым отогнутым пупком.

Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) – *Pinus sibirica*

– Шишки яйцевидно-продолговатые, длиной 3,5-4,5 см, шириной до 3,5 см.

Кедровый стланик – *Pinus pimula*

9. Шишки крупные, 5-10 см длиной, яйцевидно-конической формы с широкими до 10 мм и более семенными чешуями.....10

– Шишки более мелкие с узкими семенными чешуями.....11

10. Апофиз желто-бурый, блестящий с резко выраженным поперечным килем. Пупок явно выпуклый красно-коричневый, часто с рогообразным отростком.

Сосна крымская – *Pinus pallasiana*

– Шишки конической формы. Апофиз сравнительно плоский, блестящий, темно-коричневый. Пупок эллипсоидальный, серый, вытянут поперек семенной чешуи, слегка вдавленный.

Сосна пицундская – *Pinus pityusa*

11. Шишки конические, роговидно-изогнутые, длиной 3-6 см, раскрываются слабо. Шишки блестящие, серовато-желтые. Апофиз плоский.

Сосна банка – *Pinus banksiana*

– Зрелые шишки широко раскрывающиеся, сочетание признаков иное.....12

12. Шишки яйцевидно-конической формы. Апофиз бугорчатый. Пупок часто у основания шишки с одной стороны оттянут, имеет вид соска, и загнут книзу.

Сосна обыкновенная – *Pinus sylvestris*

– Шишки яйцевидно-округлой формы. Основание раскрывшейся шишки дисковидное. Пупок часто шиловидный, окаймлен полоской черного цвета.

Сосна горная – *Pinus mugo*

13. Шишки мелкие, 20-40 мм длиной, яйцевидные.....14

– Шишки более крупные, овально-продолговато-цилиндрические....18

14. Шишки мелкие, до 25 мм длиной. Семенные чешуи в количестве 10-25 шт., расположены в 3-4 ряда, тонкие, блестящие, голые, широко раскрываются, на вершине иногда неравномерно выемчатые или срезанные (шишки напоминают розочку). Кроющие чешуи видны в основании шишки.

Лиственница Гмелина, даурская – *Larix gmelinii*

– Шишки крупнее. Количество семенных чешуй больше и они расположены в 5-8 рядов.....15

15. Семенные чешуи плотные, деревянистые, ложкообразные, с рыжим опушением на спинке у свежих шишек. Верхний край загнут внутрь. Количество чешуй 22-38 шт.....16

– Семенные чешуи выпуклые, без опушения, более тонкие с отогнутым наружу волнистым верхним краем. Количество чешуй 45-70 шт.....17

16. Шишки яйцевидные, бурые, у молодых семенные чешуи с рыжим густым опушением снаружи. Длина шишек 25-30 мм. Количество семенных чешуй 22-38.

Лиственница сибирская – *Larix sibirica*

– Шишки более широкие, яйцевидно-округлые, семенные чешуйки снаружи слегка опушены (у свежих шишек). Длина шишек до 40 мм, ширина почти равна длине.

Лиственница Сукачева – *Larix sukaczewii*

17. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 2-4 см, слабо раскрывающиеся. Семенные чешуи тонкие, многочисленные (45-70 шт.), с волнистым верхним краем, без опушения. Кроющие чешуйки видны не только в нижних рядах, но высовываются "язычками" в средних и иногда верхних рядах.

Лиственница европейская – *Larix decidua*

– Шишки округло-овальные, длиной 2,0-3,5 см. Семенные чешуйки тонкие кожистые, верхушки волнистые, отогнуты наружу. Кроющие чешуйки видны лишь в нижних рядах.

Лиственница японская – *Larix leptolepis*

18. Шишки овально-цилиндрические, 40-135 мм длиной. Семенные чешуи деревянисто-кожистые, коричневые, широкозакругленные, цельно-

крайние. Кроющие чешуи значительно длиннее семенных, трехлопастные, с очень узкой и более длинной средней лопастью.

Псевдотсуга Мензиса – *Pseudotsuga menziesii*

– Кроющие чешуи не видны.....19

19. Семенные чешуи шишек обратнойцевидные, цельнокрайние, закругленные, копытообразной формы.....20

– Семенные чешуи шишек клиновидные, часто морщинистые, по краю выемчатые или зубчатые.....22

20. Шишки небольшие, тонкие, 30-60 мм длиной. Семенные чешуи матовые с очень узкой блестящей полоской по краю, клиновидные при освещении.

Ель канадская – *Picea glauca*

– Шишки более крупные. Сочетание признаков иное.....21

21. Длина шишек 50-80 мм. Концы семенных чешуй несколько загнуты внутрь, вследствие чего в открытом состоянии шишки верхушка чешуи направлена вверх.

Ель сибирская – *Picea obovata*

– Шишки жесткие, 60-100 мм длиной. Семенные чешуи редко расположенные, матовые, по краю блестящие.

Ель восточная – *Picea orientalis*

22. Шишки буро- или желтовато-коричневые, длиной 10-16 см. Семенные чешуи жесткие ромбовидные, по краю мелкозубчатые.

Ель обыкновенная, европейская – *Picea abies*

– Шишки светлоокрашенные, мягкие, меньших размеров.....23

23. Шишки светло-желтые. Концы чешуи желобчатые, зазубренные, направлены параллельно оси шишки. Длина шишки 6-10 см.

Ель колючая – *Picea pungens*

– Шишки светло-коричневые, 3-8 см длиной. Концы семенных чешуй коричневые, слегка загнуты внутрь, зазубренные.

Ель аянская – *Picea ajanensis*

Лабораторная работа 3

Определение видов хвойных по побегам и хвое

Материал: гербарные образцы побегов разных видов хвойных.

Задание 1. Определить с помощью ключа виды хвойных в выданном гербарии.

Задание 2. Зарисовать в альбоме особенности строения побегов и хвои определенных видов.

Задание 3. Описать определенные виды по следующей схеме:

- русское и латинское название вида,
- характер расположения хвои,
- способ прикрепления хвои к побегу,
- размер хвои,
- строение почек, их засмоленность,
- опушенность побегов,
- роль в лесообразовании и экологическая особенность видов,
- ареал,
- хозяйственное значение видов.

Задание 4. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Задание 5. Провести сравнение морфологических признаков видов семейств Pinaceae и Cupressaceae

Ключ к определению видов хвойных по побегам и хвое

1. Хвоя расположена пучками на укороченных побегах.....2
– Укороченных побегов нет.....4
2. Хвоя расположена на укороченных побегах в большом числе, а на удлиненных побегах текущего года – одиночно.

Лиственница Сукачева – *Larix sukaczewii*

- Хвоя в пучках по 2-5 шт.....3
- 3. Хвоя в пучках по 2 шт., темно-зеленая с выпуклой стороны и сизоватая желобчатая снизу.

Сосна обыкновенная – *Pinus sylvestris*

- Хвоя в пучках по 5 шт., темно-зеленая, блестящая, по бокам с голубоватыми устьичными полосками. Молодые побеги рыжевато-опушенные.

Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) – *Pinus sibirica*

4. Хвоя располагается мутовками по 3, кинжаловидная с оттянутой заостренной вершинкой, килеватая в поперечном сечении, короткая, до 15 мм.

Можжевельник обыкновенный – *Juniperus communis*

- Хвоя игловидная или чешуевидная располагается на побегах одиночно спирально или супротивно накрест.....5
- 5. Хвоя игловидная расположена спирально, но иногда вследствие поворота над своим основанием приведена в двурядное положение.....6
– Хвоя чешуевидная расположена супротивно накрест.....13
- 6. Хвоя линейная или игловидная, низбегающая по побегу.....7

– Хвоя располагается на листовых подушечках или крепится к побегу пяткообразным округлым основанием.....9

7. Хвоя линейная короткочерешковая, тупо заостренная, в поперечном сечении килеватая, на боковых побегах расположена двурядно.

Тис ягодный – *Taxus baccata*

– Сочетание признаков иное.....8

8. Хвоя линейная, округло-заостренная, плоская, снизу с двумя сизоватыми полосками. Хвоя расположена двурядно, гребенчато, у основания и у вершины побега более короткая, чем в центральной части.

Секвойя вечнозеленая – *Sequoia sempervirens*

– Хвоя шиловидная, короткая, до 10 мм длиной, прямая, жесткая, расположена спирально.

Секвойядендрон гигантский – *Sequoiadendron giganteum*

9. Хвоя на листовых подушечках.....10

– Хвоя крепится к побегу пяткообразным основанием. Опавшие хвоинки оставляют на побегах выемчатые рубцы овальной или округлой формы.....12

10. Хвоя короткочерешчатая, к побегам крепится на небольших подушечках, распределена настильно, узколинейная, уплощенная, снизу килеватая с сизым оттенком.

Псевдотсуга Мензиса (дугласия) – *Pseudotsuga menziesii*

– Хвоя жесткая, острая, тупочетырехгранная.....11

11. Хвоя ярко- или темно-зеленая. Молодые побеги желтоватого цвета, голые, иногда с рыжеватым опушением.

Ель сибирская – *Picea obovata*

– Хвоя голубовато-зеленая, иногда серебристо-зеленая, грубая, жесткая, торчащая во все стороны от побега. Молодые побеги голые, рыжеватые.

Ель колючая – *Picea pungens*

12. Почки округлые, серо-зеленые, сплошь залиты прозрачной смолой. Хвоя мягкая, расположена на побегах настильно. На хвое снизу две беловатые полоски.

Пихта сибирская – *Abies sibirica*

– Почки яйцевидно-шаровидные, красновато-бурые, слабо смолистые. Хвоя густо зеленая, блестящая с двумя сизоватыми полосками на нижней стороне, длиной до 15-40 мм и шириной до 1,5-2,5 мм.

Пихта кавказская – *Abies nordmanniana*

13. Хвоя двух типов. На сильно рослых побегах у молодых растений игловидная, на остальных чешуевидная, супротивно накрест расположенная.

Можжевельник казацкий – *Juniperus sabina*

– Молодые побеги круглые или четырехгранные Хвоя мелкая, ромбическая, чешуевидная, плотно охватывает побег. Железки на всех чешуйках.

Кипарис вечнозеленый – *Cupressus sempervirens*

– Молодые побеги плоские.....14

14. Большинство ветвей ветвится в горизонтальной плоскости. Хвоя чешуевидная, куполообразной формы, плотно прилегает к побегу. На средней чешуйке выпуклая округлая железка. Длина чешуй 3-4 мм.

Туя западная – *Thuja occidentalis*

– Побеги располагаются в вертикальной плоскости. Хвоя чешуевидная, удлинённая, с вогнутой вытянутой смоляной железкой.

Платикладус восточный (биота восточная) – *Platyclusus orientalis* (*Biota orientalis*)

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (Magnoliophyta, или Angiospermae)

Древесные растения представлены в основном среди класса двудольных (Magnoliopsida). Однодольные древесные растения (класс Liliopsida), которые в большинстве своем относятся к пальмовым и злаковым и произрастают в тропических районах, на лабораторных занятиях не рассматриваются.

Лабораторная работа 4 Морфологические и экологические особенности древесных растений семейства Березовые (Betulaceae) и Буковые (Fagaceae)

Материал: гербарные образцы весенних, летних и зимних побегов, плоды, образцы древесины и коры, препараты мужских и женских соцветий.

Задание 1. Изучить и описать морфологические и экологические особенности березы повислой (*Betula pendula*) и дуба черешчатого (*Quercus robur*).

Описание в альбоме или на специальном бланке произвести по ниже приведенной схеме.

Жизненная форма.

Побеги:

- тип нарастания,
- расположение побегов,
- тип и форма побегов,
- кора (цвет, форма, толщина).

Почки.

Листья:

- расположение,
- тип и размер,
- форма листовой пластинки,
- тип жилкования,
- цвет и опушенность,
- наличие и форма прилистников,
- край листовой пластинки.

Пол растения.

Тип цветка.

Тип соцветия.

Тип плода.

Всходы.

Древесина.

Корневая система.

Экологические особенности и роль в лесообразовании.

Хозяйственная ценность.

Ареал.

Задание 2. Зарисовать весенние побеги с пестичными и тычиночными соцветиями, строение пестичных и тычиночных цветов, облиственные летние удлинённые и укороченные побеги, плоды.

Задание 3. Провести сравнение морфологических и экологических особенностей *B. pendula* и *B. pubescens* по следующей форме:

Признаки и свойства	<i>B. pendula</i>	<i>B. pubescens</i>
Строение побегов		
Форма листовой пластинки		
Край листовой пластинки		
Строение плодов		
Строение плодовых чешуек		
Строение коры		
Экологические особенности		

Задание 4. Нанести на контурную карту границы ареалов *B. pendula*, *B. pubescens* и *Quercus robur*.

Лабораторная работа 5 **Определение видов семейств** **Betulaceae и Fagaceae** **по побегам в облиственном состоянии**

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды семейств Betulaceae и Fagaceae.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по следующей схеме:

- русское и латинское название растения,
- строение побегов,
- расположение листьев,
- тип листа,
- форма листовой пластинки,
- край листовой пластинки,
- тип жилкования,
- наличие опушения, железок,
- наличие прилистников,
- экологические особенности,
- роль в лесообразовании,
- ареал вида.

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ определения видов семейств Betulaceae и Fagaceae

- 1. Листья простые, цельные.....2
 - Листья лопатные.....10
- 2. Листья широкоэллиптические, цельнокрайние, иногда редкозубчатые, 7-14 см длиной и 3-7 см шириной, жилки 7-14 пар.

Бук восточный – *Fagus orientalis*

– Листья узкие, удлинённо-эллиптические или ланцетные, у основания закругленные, на вершине заостренные, редкопильчатые, зубцы заканчиваются шиловидным острием и направлены к вершине.

Каштан посевной – *Castanea sativa*

– Листья яйцевидные или обратнояйцевидные, широкоэллиптические, по краю пильчатые, двоякопильчатые.....3

3. Листья крупные, 5-15 см длиной, широкоэллиптические, яйцевидные или обратнояйцевидные, с верхней стороны шершавые, снизу мягкоопушенные, зеленые, по краю двоякопильчатые, расположены на побегах в два ряда.....4

– Листья иной формы и меньших размеров.....5

4. Листья широкоэллиптические или обратнояйцевидные, иногда с 2-3 лопастями. Черешки листьев короткие, 1,0...1,5 см.

Лещина обыкновенная, орешник – *Corylus avellana*

– Листья на вершине срезанные, с двумя лопастями, которые иногда длиннее короткозаостренной вершины. Черешки листьев сравнительно длинные, более 1,5 см.

Лещина разнолистная – *Corylus heterophylla*

5. Листья яйцевидно-продолговатые, эллиптические, у основания закругленные или неравнобоко-слабосердцевидные, двоякопильчатые, обычно волнистые от сильно выступающих боковых жилок. Жилок 10-15 пар.

Граб обыкновенный – *Caprinus betulus*

– Листья иной формы.....6

6. Листья круглые или овальные, по краю городчатые или пильчатые, очень мелкие, 1-3,5 см длиной.....7

– Листья более крупные, длиннее 3,5 см.....8

7. Листья яйцевидно-округлые, эллипсоидальные, крупнопильчатые, 1-3 см длиной, боковых жилок 4-5. Молодые побеги более или менее опушенные, впоследствии голые, густо покрыты янтарного цвета железками.

Береза низкая – *Betula humilis*

– Листья очень мелкие, 0,5-1,5 см длиной, округлые, кожистые, причем ширина листа часто больше длины. Молодые побеги опушенные, всегда без железок.

Береза карликовая – *Betula nana*

8. Листья обратнояйцевидные, выемчатые на вершине, голые, с обеих сторон зеленые. Молодые листья и побеги клейкие. Побеги голые, почки черешчатые.

Ольха черная, клейкая – *Alnus glutinosa*

– Листья эллиптические или яйцевидные, снизу опушенные, матовые, сизовато-серые. Молодые побеги опушенные, почки черешчатые.

Ольха серая – *Alnus incana*

– Листья ромбические, треугольные или яйцевидные, с обеих сторон зеленые. Строение почек иное.....9

9. Листья ромбовиднояйцевидные или почти треугольные, длиннозаостренные, с широко клиновидным, реже усеченным или округлым основанием, длинно-черешчатые, в молодости слегка волосистые, впоследствии совершенно голые. Молодые побеги часто густо покрыты восковыми железками, имеющими вид бородавочек.

Береза повислая (бородавчатая) – *Betula pendula*

– Листья широкояйцевидные с округлым, реже клиновидным или сердцевидным основанием. Жилок 5-7 пар. Молодые побеги бархатистоопушенные.

Береза пушистая – *B. pubescens*

– Листья яйцевидные или широкоовальные с обрубленным тупым, слабоклиновидным или сердцевидным основанием. Жилок 6-10 пар. Вдоль жилок на верхней поверхности листа углубленные бороздки. Молодые листья и побеги более или менее опушены.

Береза каменная, Эрмана – *Betula ermanii*

10. Листья с заостренными остистыми, зачастую редкозубчатыми, лопастями. Черешки листьев длинные, до 4,5 см.

Дуб красный – *Quercus rubra*

– Листья с закругленными лопастями.....11

11. Листья крупные, обратнойяйцевидные с неглубокими лопастями, почти сидячие, черешки листьев 20-40 мм длиной.

Дуб монгольский – *Quercus mongolica*

– Листья удлинённой обратнойяйцевидной формы с черешками короче 1/10 длины главной жилки, лопастей 4-7 пар. Кроме боковых жилок, идущих до верхушки лопастей, имеются еще и промежуточные.

Дуб черешчатый – *Quercus robur*

– Листья с более длинными черешками, равными 1/8-1/3 длины главной жилки, лопастей 5-8 пар. Промежуточных жилок нет.

Дуб скальный – *Quercus petraea*

Лабораторная работа 6

Определение видов семейств Ильмовые (Ulmaceae), Ореховые (Juglandaceae), Барбарисовые (Berberidaceae), Липовые (Tiliaceae) и Волчниковые (Thymelaeaceae) по побегам в облиственном состоянии

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по следующей схеме:

- русское и латинское название растения,
- строение побегов,
- расположение листьев,
- тип листа,
- форма листовой пластинки,
- край листовой пластинки,
- тип жилкования,
- наличие опушения, железок,
- наличие прилистников,
- экологические особенности,
- роль в лесообразовании,
- ареал вида.

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ определения видов семейств *Ulmaceae*, *Juglandaceae*, *Berberidaceae*, *Tiliaceae* и *Thymelaeaceae*

- 1.** Листья простые.....2
- Листья сложные.....8
- 2.** Побеги с колючками.....3
- Побеги без колючек.....4
- 3.** Листья обратнойцевидные, лопатовидные, пластинка их постепенно переходит в черешок, острозубчатые. Молодые побеги ребристые. Колючки обычно 3-раздельные, реже 5-раздельные.

Барбарис обыкновенный – *Berberis vulgaris*

– Листья округлые или обратнойцевидные, постепенно сужающиеся к черешку, цельнокрайние. Колючки на побегах простые, тонкие и упругие.

Барбарис Тунберга – *Berberis thunbergii*

4. Листья очередные, цельнокрайние, голые, обратнотанцетные, одна сторона пластинки опускается по черешку ниже другой. Листья собраны в верхней части побегов.

Волчье лыко, волчник смертельный – *Daphne mezereum*

- Листья цельные, по краю пильчатые или дважды пильчатые.....5
- 5.** Жилкование листьев перистокрабежное.....6
- Жилкование листьев пальчатокрабежное.....7

6. Листья у основания сильно неравнобокие, эллиптические или обратнояйцевидные, голые, снизу иногда опушенные. Боковые жилки не ветвятся, иногда на конце раздваиваются лишь 1-3 жилки.

Вяз гладкий – *Ulmus laevis*

– Листья более симметричные, обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, по краю двоякопильчатые, сверху шероховатые, снизу вдоль жилок жестковолосистые, часто на вершине с тремя крупными зубцами. Боковые жилки на конце чаще раздвоенные.

Вяз голый, вяз шершавый, ильм – *Ulmus glabra*

– Листья равнобокие, продолговато-ланцетные или удлинено-яйцевидные длиной 3-7 см. Побеги часто располагаются двурядно.

Вяз приземистый – *Ulmus pumila*

7. Листья большей частью сердцевидно- или широкояйцевидные, часто несимметричные, сверху темно-зеленые, голые, снизу светло-зеленые с пучками рыжеватых волосков в углах жилок, по краю пильчатые с прижатыми кверху зубцами. Длина листа 4-8 см. Побеги голые.

Липа мелколистная, сердцевидная – *Tilia cordata*

– Листья более крупные, по краю зубчатые или пальчато-зубчатые, зубцы сравнительно короткие. Молодые побеги и нижняя сторона листьев серовато-опушенные.

Липа крупнолистная – *Tilia platyphyllos*

8. Листья сложные, непарноперистые, жесткие, кожистые, листья 10-20 см длиной. Листочков 7-11, они 4-8 см длиной, продолговатые, по краю выемчато-зубчатые с колючими твердыми зубцами, сверху темно-зеленые, глянцевиые. Вечнозеленый кустарник до 1 м высотой.

Магония падуболистная – *Mahonia aquifolium*

– Листья более крупные. Листочки цельнокрайние или мелкопильчатые, матово-зеленые. Растения листопадные.....9

9. Листья непарноперистые. Листочков 5-7. Листочки продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, реже с мелкими зубчиками. Верхний листочек крупнее других.

Орех грецкий – *Juglans regia*

– Листья крупные до 1,2 м длиной, состоят из 11-19 листочков. Листочки мелкопильчатые. Края листочков в средней части почти параллельные. Листочки и стержень листа опушенные.

Орех маньчжурский – *Juglans mandshurica*

Лабораторная работа 7 Семейство Ивовые (Salicaceae)

Задание 1. Изучить и описать морфологические и экологические особенности тополя дрожащего, осины (*Populus tremula*)

Материал: гербарные образцы весенних, летних и зимних побегов, плоды, образцы древесины и коры, препараты мужских и женских соцветий.

Описание в альбоме или на специальном бланке произвести по схеме, приведенной в лабораторной работе 4. Обратить внимание на строение черешка листа.

Задание 2. Зарисовать весенние побеги с пестичными и тычиночными соцветиями, строение пестичных и тычиночных цветов, облиственные летние удлинённые и укороченные побеги, плоды.

Задание 3. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 4. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по следующей схеме:

- русское и латинское название растения,
- строение побегов,
- расположение листьев,
- тип листа,
- форма листовой пластинки,
- край листовой пластинки,
- тип жилкования,
- наличие опушения, железок,
- наличие прилистников,
- экологические особенности,
- роль в лесообразовании,
- ареал вида.

При описании тополей обратить внимание на строение черешков листьев, наличие железок, на размеры, строение и засмоленность почек. У ив особо отметить наличие прилистников, их форму, размеры и сохранность, строение почек.

Задание 5. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ определения видов семейства Salicaceae

1. Листья узкие, продолговато-ланцетные, эллиптические. Длина их более чем в 3 раза превышает ширину.....2
 - Листья широколанцетные, яйцевидно-ромбические, обратнойцевидные, длина их немного превышает ширину.....6
2. Листья голые или только в молодости покрыты пушком.....3
 - Листья опушены.....5

3. Листья продолговато-ланцетные, вытянутые в тонкое часто скошенное (серповидно) острие, 10-15 см длиной; с верхней стороны темно-зеленые, блестящие, снизу сизые. Прилистники почковидные или яйцевидные, крупнымчато-зубчатые, рано опадающие. Побеги голые, в сочленениях ломкие.

Ива ломкая (верба, ракита) – *Salix fragilis*

– Побеги более гибкие. Сочетание признаков иное.....4

4. Побеги оливково-бурые или темно-зеленые. Листья широколанцетные или эллиптические, часто с параллельными краями, сверху темно-зеленые, снизу светлее, с резко выделяющейся желтой главной жилкой. Прилистники почковидные или яйцевидно-ланцетные, зубчатые, долго сохраняющиеся.

Ива трехтычинковая (миндально-листная, белотал) – *Salix triandra*

– Побеги красноватые с сизым налетом. Листья ланцетные, длинно-заостренные, у основания клиновидные, реже линейные. Прилистники ланцетные, острые, равны длине черешка или длиннее.

Ива остролистная (шелюга красная, краснотал) – *Salix acutifolia*

5. Листья по краю мелкопильчатые, ланцетные, линейно-ланцетные, заостренные. Молодые побеги и листья с серебристым опушением, позднее опушение на побегах и верхней стороне листа исчезает

Ива белая (ветла) – *Salix alba*.

– Листья линейно-ланцетные, цельнокрайние или слабовеиччатые, слегка завернутые, к основанию и верхушке равномерно суженные, снизу шелковисто-войлочные.

Ива прутовидная– *Salix viminalis L.*

6. Почки на побегах покрыты одной чешуйкой в виде колпачка, образованного из двух сросшихся чешуек.....7

– Почки на побегах крупные, часто смолистые, покрыты большим числом чешуек.....10

7. Листья опушенные, морщинистые.....8

– Листья голые.....9

8. Листья яйцевидные или эллиптические, расширенные посередине, крупные, морщинистые, сверху темно-зеленые, снизу серовато-войлочные. Побеги и почки голые. Прилистники почковидные, опадают рано.

Ива козья (бредина) – *Salix caprea*

– Листья обратнояйцевидные, сероваточные, морщинистые, короткозаостренные. Прилистники почковидные, зубчатые, долго сохраняются. Побеги опушенные. Окоренная древесина имеет продольные валики.

Ива серая, пепельная – *Salix cinerea*

9. Листья крупные, 5-13 см длиной, плотные, кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светлее, яйцевидно-продолговатые или широколанцетные.

Ива пятитычинковая – *Salix pentandra*

– Листья мелкие, 1-3,5 см длиной, яйцевидные или эллиптические, цельнокрайние, сверху синевато-зеленые, снизу сизые, после сушки чернеющие.

Ива черничная – *Salix myrtilloides*

10. Жилкование листьев пальчато-сетчатое. Листья пальчато-лопастные или цельные. Почки не смолистые.....11

– Жилкование листьев перисто-сетчатое. Листья цельные, треугольно-ромбические, эллиптические, ланцетные, яйцевидные.....12

11. Листья 3-5-лопастные. Молодые листья и побеги беловойлочные, серебристые. Черешки листьев короткие, цилиндрические.

Тополь белый – *Populus alba*

В озеленении Екатеринбурга широко используется гибрид тополя белого и тополя Болле (P.bolleana) - тополь Свердловский серебристый, пирамидальный, селекции проф. Н.А.Коновалова, сходный по строению побегов и листьев с тополем белым.

– Листья округлые, городчато-зубчатые или выемчато-зубчатые, плотные, голые. Черешки листьев длинные, сплюснутые. На порослевых побегах листья крупные, яйцевидные с сердцевидным основанием, пильчатые, голые или шелковисто-опушенные.

Осина, тополь дрожащий – *Populus tremula*

12. Листья округло-треугольные или ромбические, ярко-зеленые, блестящие. Побеги округлые, светло-желтые, у поросли красноватые, ребристые. Черешки листьев сплюснутые.

Тополь черный (осокорь) – *Populus nigra*

– Листья, яйцевидно-ланцетные, эллиптические, яйцевидные.....13

13. Листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные, остро мелкопильчатые, к вершине постепенно заостряющиеся. Черешок листа сверху желобчатый, опушенный. Однолетние побеги крылато ребристые с пробковыми выростами, светло-желтые или серые, четырехгранные.

Тополь лавролистный – *Populus laurifolia*

– Побеги круглые.....14

14. Листья удлинненно-яйцевидные или ланцетные, темно-зеленые, основание округлое или клиновидное, побеги темные. Общий фон окраски листьев буроватый. Почки крупные,

Тополь печальный – *Populus tristis*

– Листья эллиптические, ланцетно-эллиптические, округлые, короткозаостренные, сверху темно-зеленые, с нижней стороны беловатые. Черешки листьев округлые, опушенные. Побеги коричневые или желтовато-зеленые.

Тополь душистый – *Populus suaveolens*

– Листья яйцевидные или яйцевидно-эллиптические с острой вершиной и закругленным основанием. Черешки листьев круглые, голые. Побеги круглые или тупоребристые (пятигранные), блестящие.

Тополь бальзамический – *Populus balsamifera*

**Лабораторная работа 8
Определение видов семейств
Крыжовниковые (*Grossulariaceae*),
Гортензиевые (*Hydrangeaceae*),
Розоцветные (*Rosaceae*) и Бобовые (*Fabaceae*)**

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по принятой схеме (см. лабораторную работу 4). Описание видов семейств *Rosaceae* и *Fabaceae* сделать по подсемействам.

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

**Ключ определения видов семейств *Grossulariaceae*,
Hydrangeaceae, *Rosaceae* и *Fabaceae***

- 1. Листья простые.....2
- Листья сложные.....24
- 2. Листья цельные.....3
- Листья, расчлененные на лопасти.....19
- 3. Листья супротивные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, с постепенно суженным или несколько закругленным основанием. Длинной 1,5-4 см, на порослевых побегах до 6 см. Зубцы по краю листа расположены очень редко.

Чубушник обыкновенный, венечный – *Philadelphus coronarius*

– Листорасположение очередное.....4

4. Листья цельнокрайние.....5
 – Листья нецельнокрайние.....7
5. Листья обратноланцетные на вершине закругленные с коротким шипиком, у основания сильно суженные, низбегающие к черешку до его основания, голые, серо-зеленые.

Сибирка алтайская – *Sibiraea altaensis*

– Листья широкояйцевидные, округлые или эллиптические, толстые, кожистые. Длина их 3-5 см.....6

6. Листья сверху блестящие, на концах заостренные. Молодые побеги и листья густо прижатоопушенные. Длина листьев 2-5 см, длина черешков 0,2-0,6 см. Плоды черные, блестящие.

Кизильник блестящий – *Cotoneaster lucidus*

– Листья на вершине обычно тупые, нередко выемчатые, сверху голые или слегка опушенные, снизу бело- или зеленовато-войлочные, 3-6 см длиной с короткими черешками 1-3 мм. Зрелые плоды черные с сизым налетом.

Кизильник черноплодный – *Cotoneaster melanocarpus*

7. Листья широкоэллиптические или яйцевидные с оттянутой острой верхушкой, по краю остропильчатые, с щетинистыми частыми зубцами, сверху блестящие, темно-зеленые. В гербарии листья всегда чернеют. Побеги с колючками.

Груша уссурийская – *Pyrus ussuriensis*

- Побеги неколючие. Сочетание признаков иное.....8
8. Листья с короткими, обычно не превышающими 1/3 длины листовой пластинки черешками.....9
 – Листья с более длинными черешками.....17
9. Листья удлинненно-ланцетные, ланцетные, узкие.....10
 – Листья яйцевидные, удлинненно-яйцевидные, широколанцетные, овальные, эллиптические.....11
10. Листья удлинненно-ланцетные, голые, почти от основания остропильчатые, длиной 3-8 см, черешки 2-8 мм длиной.

Спирея иволистная – *Spiraea salicifolia*

– Листья узкие, ланцетные, линейно-ланцетные, иногда узко обратнояйцевидные, 3-8 см длиной, голые, с основанием, постепенно суженным в черешок. Побеги тонкие коричневые или красно-бурые, блестящие с мелкими, расположенными часто по 2-3 на одной листовой подушке, почками.

Миндаль низкий (бобовник) – *Amygdalus nana*

11. Листья овальные или яйцевидно-продолговатые, длиной 4-6 см, цельнокрайние или в верхней части крупнозубчатые, опушенные.

Спирея (таволга) средняя – *Spiraea media*

– Листья от широкоэллиптических до яйцевидно-ланцетных, удлинённых. Сочетание признаков иное.....12

12. Листья мелкие, 3-5 см длиной.....13

– Листья, как правило, 6 см и более.....14

13. Листья широкоэллиптические или обратнойцевидные, морщинистые, крупнозубчатые, снизу опушенные.

Вишня войлочная – *Cerasus tomentosa*

– Листья вытянуто-обратнойцевидные, у вершины тупые, округлые или слегка заостренные, к основанию клиновидные или суженные в черешок, по краю зубчатые или городчатые, голые, сверху темно-зеленые, блестящие.

Вишня кустарниковая, степная – *Cerasus fruticosa*

14. Листья яйцевидные с постепенно оттянутым остроконечием, с нижней стороны имеют многочисленные железки, по краю остропильчатые. Боковых жилок более 10 пар.

Черемуха Маака – *Padus maackii*

– Железки только на черешках листьев или по главной жилке.....15

15. Листья эллиптические или обратнойцевидные, симметричные, заостренные, по краю зубчато-городчатые, по главной жилке с железками, плотные, сверху ярко-зеленые. Молодые побеги и листья с опушением.

Арония черноплодная – *Aronia melanocarpa*

– Железки на черешках листьев. Листья иного вида.....16

16. Листья широкоэллиптические или обратнойцевидные с наибольшей шириной обычно в верхней части пластинки, на вершине заостренные, по краю остропильчатые. Черешки листьев с 4, реже 2 железками. Сильно развитых боковых жилок обычно менее 8 пар.

Черемуха виргинская – *Padus virginiana*

– Листья эллиптические, овальные с короткой острой, вершиной, сверху темно-зеленые, морщинистые. Черешки листьев с 2 железками.

Черемуха птичья, обыкновенная – *Padus avium*

– Листья удлинённо-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные с вытянутой заостренной вершиной, по краю мелкопильчатые.

Черемуха пенсильванская – *Padus pennsylvanica*

17. Листья эллиптические или яйцевидные с заостренной верхушкой и черешками, равными длине листовой пластинки.....18

– Черешки листьев более короткие. Листья округлые или эллиптические, 2,5-5 см длиной, плотные по краю с относительно крупными вперед направленными зубцами, при основании слабосердцевидные, закругленные или ширококлиновидные, у верхушки притупленные, иногда выемчатые, реже очень коротко заостренные.

Ирга овальная – *Amelanchier ovalis*

На Урале часто разводится ирга колосистая (*A. spicata*), которая отличается от ирги овальной главным образом более длинным столбиком пестика.

18. Листья обратнояйцевидные или эллиптические, к обоим концам суженные, с сильным красноватым оттенком, иногда фиолетово-красные. Побеги и ветки красно-бурые, древесина красная.

Яблоня Недзвецкого – *Malus niedzwetzkyana*

– Листья продолговато-яйцевидные, яйцевидные или эллиптические, по краям остропильчато-зубчатые, 4-8 см длиной. Молодые побеги голые.

Яблоня ягодная – *Malus baccata*

19. Листья округло-яйцевидные, 5-7 лопастей, нередко глубоколопастные или надрезанные с ширококлиновидным основанием, постепенно переходящим в черешок. Жилкование перистое. Прилистники серповидные, крупнозубчатые, долго сохраняющиеся. Побеги красно- или серовато-красно-бурые, лоснящиеся, с крепкими колючками 2-5 см длиной.

Боярышник кроваво-красный (сибирский) – *Crataegus sanguinea*

– Листья пальчато-лопастные с пальчатым жилкованием.....20

20. Листья трех-пятилопастные, опушенные. Лопастные округлые, тупозубчатые. Побеги с тонкими прямыми двух-трехраздельными шипами, в междоузлиях – с простыми.

Крыжовник европейский (отклоненный) – *Grossularia reclinata*

– Побеги без шипов.....21

21. Листья яйцевидные, трех-пятилопастные, голые. Побеги с желтовато-бурой сердцевинной, окантованные. Кора отслаивается продольными мочалистыми волокнами. Крупный сильно ветвистый кустарник.

Пузыреплодник калинолистный – *Physocarpus opulifolius*

– Побеги круглые. Сочетание признаков иное.....22

22. Листья крупные, 6-10 см длиной и шириной, трех-пятилопастные, сверху голые, снизу с опушением по жилкам. Лопастные треугольные, неравнозубчатые. Побеги и листья усеяны янтарно-желтыми железками, пахучие.

Смородина черная – *Ribes nigrum*

– Листья, как и побеги непахучие, без точечных железок на нижней стороне листьев.....23

23. Листья до 5 см длиной и до 6 см шириной с 3, редко 5 глубокими тупыми двух-трехзубчатыми (иногда цельнокрайними) лопастями, голые, при основании клиновидно суженные или закругленные. Побеги коричневатые, блестящие, усеяны черными точками.

Смородина золотистая – *Ribes aureum*

– Листья мелкие, не более 3-4 см, с тремя, реже пятью заостренными лопастями. Основание листьев усеченное или клиновидно суженное. Черешки листьев короткие. Почки сидячие.

Смородина альпийская – *Ribes alpium*

– Листья чаще трехлопастные, реже лопастей 5, лопасти широкие, притупленные, основания листьев слабосердцевидные или усеченные. Черешки листьев и нижняя их часть обычно опушенные и нередко с железистыми волосками. Побеги светлые. Почки на коротких черешках.

Смородина красная – *Ribes rubrum*

24. Листья дваждыперистые.....25

– Листья единождыперистые или тройчатые.....26

25. Листья дважды- реже единождыперистосложные до 20 см длиной, листочки почти сидячие, 1,5-3 см длиной, эллиптические, цельнокрайние или мелкозубчатые, на верхушке суженные или острые. Побеги с крупными, часто разветвленными колючками.

Гледичия обыкновенная – *Gleditsia triacantos*

– Побеги без колючек. Листья серебристо-серые, состоят из основного черешка, от которого отходят 13-25 пар черешков, на каждом из них сидят 30-40 пар очень мелких листочков. Общий размер листа: 8-18 см – длина и 6-8 см – ширина.

Акация серебристая – *Acacia dealbata*

26. Листья тройчатые. Листочки эллиптически-ланцетные, на верхушке округлые, к основанию клиновидно суженные, снизу серовато-опушенные. Побеги беловато-серые от опушения.

Ракитник русский – *Chamaecytisus ruthenicus*

– Листья парноперистые.....27

– Листья непарноперистые.....28

27. Листья состоят из 8-12 пар эллиптических, цельнокрайних, голых листочков. Побеги зеленые с многочисленными парными колючками, представляющими собой видоизмененные прилистники.

Карагана древовидная (акация желтая) – *Caragana arborescens*

– Листья из четырех тесно сближенных листочков. Листочки обратно-яйцевидные, цельнокрайние до 2,5 см длиной, заканчиваются тонким шипиком. На ветвях – колючки (видоизмененные прилистники).

Карагана кустарник (чилига, дереза) – *Caragana frutex*

28. Листочки листьев цельнокрайние.....29

– Листочки листьев нецельнокрайние.....32

29. Общая длина листа до 5 см. Листочков обычно 5, изредка 3-7. Листочки ланцетные, ланцетно-яйцевидные, на верхушке коротко- или тупозаостренные, с обеих сторон опушенные, сидячие, сближенные.

Курильский чай кустарниковый (дасифора) –

Pentaphylloides fruticosa

– Листья более крупные. Листочки с черешками.....30

30. Листья из 9-21 листочка. Листочки овальные, эллиптические до 1,5-4,5 см длиной, с нижней стороны несколько светлее, голые или с редким опушением по жилкам. Побеги граненые с крепкими парными колючками у основания черешков листьев (видоизмененные прилистники).

Акация белая – *Robinia pseudoacacia*

– Побеги без колючек.....31

31. Лист состоит из 7-9 листочков. Листочки обратнойяйцевидные или яйцевидно-продолговатые, темно-зеленые сверху, кожистые, длиной до 5-8 см. Верхний листочек на длинном черешке (2,5-3 см), у боковых – черешки 3-6 мм. Молодые побеги и листья с шелковистым опушением, позднее голые.

Маакция амурская – *Maackia amurensis*

– Лист состоит из 9-31 листочков. Листочки овальные, продолговатые, длиной до 1,5-4 см, сверху зеленые, снизу светлее с темными точечными железками.

Аморфа кустарниковая – *Amorpha fruticosa*

32. Побеги с колючими острыми шипами.....33

– Побеги без шипов.....36

33. Листья красновато-бурые или зеленые с сизовато-красным оттенком, голые. Побеги темно-красные с редкими шипами, часто с сизовато-белым налетом.

Роза сизая – *Rosa rubrifolia*

– Листья зеленые.....34

34. Листья из 5-9 листочков. Листочки округлые или эллиптические, толстые, морщинистые, сверху голые, блестящие, снизу серо-зеленые,

опушенные. Побеги густо опушенные с многочисленными шипами различной величины.

Роза морщинистая – *Rosa rugosa*

– Листья гладкие, побеги без опушения.....35

35. Листочки крупнозубчатые, с обеих сторон сизоватые или серозеленые. Прилистники по краю железисто-реснитчатые, с расходящимися яйцевидно-ланцетными ушками. Шипы тонкие, прямые, многочисленные.

Роза иглистая – *Rosa acicularis*

– Листочки с прижатыми зубцами. Листья сверху темно-зеленые, снизу серозеленые. Прилистники у листьев бесплодных побегов узкие с трубчато-сходящимися ушками, на цветоносных побегах широкие, плоские, снизу пушистые. Шипы двоякие: тонкие игольчатые и крепкие изогнутые. Цветоносные побеги обычно без шипов, коричневые.

Роза майская, коричная – *Rosa majalis*

36. Листья с голым черешком. Листочки продолговато-ланцетные, к основанию клиновидно суженные и с сильно оттянутой, заостренной и несколько серповидно изогнутой верхушкой, голые. Побеги коричневатосерые, коленчатые, округлые, ломкие. Почки яйцевидные, зеленые.

Рябинник рябинолистный – *Sorbaria sorbifolia*

– Листья с опушенным черешком. Листочки яйцевидно-продолговатые или широколанцетные, у основания явно неравнобокие, у верхушки заостренные. Побеги от оливково-зеленых до красновато-бурых. Почки войлочнопущенные.

Рябина обыкновенная – *Sorbus aucuparia*

*Восточную разновидность рябины обыкновенной некоторые дендрологи выделяют в отдельный вид – *S. sibirica*.*

Лабораторная работа 9

Определение видов семейств Рутовые (Rutaceae), Кленовые (Aceraceae), Конско-каштановые (Hippocastanaceae).

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по принятой схеме (см. лабораторную работу 4).

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ определения видов семейств Rutaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae

1. Листья простые.....2
– Листья сложные.....7
2. Листья цельные (реже с небольшими лопастями), яйцевидно-продолговатые с несколько сердцевидным основанием, неравнозубчатые, голые. Побеги нетолстые» ребристые карминно- или красно-бурые со светлыми чечевичками.

Клен татарский – *Acer tataricum*

- Листья лопастные.....3
3. Листья трехлопастные с сильно удлинённой средней лопастью, плотные, голые, по краю неравнозубчатые.

Клен гиннала (приречный) – *Acer ginnala*

- Листья пяти-семилопастные.....4
4. Лопасты треугольные или яйцевидно-треугольные, цельнокрайние, на конце острые. Листья плотные, голые.

Клен моно (мелколистный) – *Acer mono*

- Лопасты зубчатые.....5
5. Лопасты с притупленными зубцами без остроконечия, пара нижних лопастей цельная. Верхняя сторона листьев обычно голая, нижняя опушенная или только в углах жилок с волосками, побеги буровато-серые.

Клен полевой – *Acer campestre*

- Зубцы лопастей заостренные, листья более крупные.....6
6. Листья крупные (до 18 см). Лопасты острые с крупными редкими острыми зубцами. Выемки между лопастями округлые.

Клен остролистный – *Acer platanoides*

- Листья глубоколопастные. Лопасты вытянутые, острозубчатые. Листья сверху ярко-зеленые, снизу серебристо-белые, в молодом возрасте опушенные.

Клен серебристый – *Acer saccharinum*

7. Листья пальчато-сложные состоят из 5-7 сидячих листочков обратнойяйцевидной формы, суженных к основанию. Почки крупные, клейкие, красно-бурые.

Каштан конский обыкновенный – *Aesculus hippocastanum*

- Листья непарноперистосложные.....8

8. Лист всегда состоит из трех листочков. Листочки плотные, ланцетные, почти одинаковые по величине, голые, по краю пильчатые. Черешок листа длинный, красный.

Клен маньчжурский – *Acer mandshuricum*

– Листочков более трех.....9

9. Листья состоят из 3-7 листочков, из которых средний шире боковых и часто трехлопастной, остальные яйцевидные, заостренные, с крупными зубцами.

Клен ясенелистный – *Acer negundo*

– Листья состоят из 9-13 цельнокрайних, иногда мелко зубчатых, плотных, овально-ланцетных, остроконечных листочков. Листья при растирании издают неприятный запах.

Бархат амурский – *Phellodendron amurense*

Лабораторная работа 10
Определение видов семейств Лоховые (*Elaeagnaceae*),
Бересклетовые (*Celastraceae*),
Крушиновые (*Rhamnaceae*),
Кизилловые (*Cornaceae*).

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по принятой схеме (см. лабораторную работу 4).

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

**Ключ определения видов семейств *Elaeagnaceae*, *Celastraceae*,
Rhamnaceae, *Cornaceae***

- 1. Листорасположение очередное.....2
 - Листорасположение супротивное.....6
- 2. Молодые побеги и листья бело- или желтовато-, или буровато-серебристые от густо покрывающих их простых или звездчатых чешуек.....3
 - Побеги и листья голые или слабоопушенные. Листья очередные или косопротивные.....5
- 3. Листья эллиптические, яйцевидные, с обеих сторон серебристые от множества чешуек, кожистые. Побеги и почки буровато-бронзовые с мелкими черными точками.

Лох серебристый – *Elaeagnus argentea*

– Побеги другого цвета. Растения колючие.....4

4. Листья линейно-ланцетные или линейные, 3-7 см длиной, опушенные, серо-зеленые сверху и серебристо-белые снизу, на коротких черешках. Центральная жилка листьев и побеги с рыжими чешуйками. На побегах колючки.

Облепиха крушиновидная – *Hippophaë rhamnoides*

– Листья линейные, ланцетные или узколанцетные, сверху серо-зеленые, снизу серебристо-белые. Побеги и почки серебристые. Иногда побеги с колючками.

Лох узколистый – *Elaeagnus angustifolia*

5. Листья цельнокрайние, овальные или широкообратнояцевидные, на коротких черешках, тонкие с 6-8 парами боковых жилок. Боковые жилки дугообразно изогнуты и параллельны друг другу. Побеги красновато-бурые с сероватым налетом и многочисленными светлыми чечевичками.

Крушина ломкая – *Frangula alnus*

– Листья овальные или яйцевидные, по краю мелкопильчатые, часто супротивные. Боковые жилки дугообразно направлены к вершине. Побеги обычно с колючкой на конце.

Жестер слабительный – *Rhamnus cathartica*.

6. Листья цельнокрайние. Жилкование дугонервное.....7

– Листья по краю пильчатые.....8

7. Листья широкояцевидные или широкоовальные, у основания закругленные, реже суженные. Побеги кораллово- или карминно-красные.

Свидина белая (дерен сибирский) – *Swida alba*

– Листья овальные, эллиптические, суженные к основанию и полого заостренные у верхушки. Побеги темно-красные.

Свидина отпрысковая – *Swida stolonifera*

8. Листья яйцевидные или эллиптические, 3-5 см длиной, мелкопильчатые по краю. Побеги зеленые, густо усеяны темными бородавками.

Бересклет бородавчатый – *Euonymus verrucosa*

– Листья обратнояцевидные, эллиптические, слегка кожистые, темно-зеленые сверху, более светлые снизу. Побеги и ветви более или менее четырехгранные от пробковых наростов, зеленые.

Бересклет европейский – *Euonymus europaea*

Лабораторная работа 11

Определение видов семейств Жимолостные (Caprifoliaceae), Маслиновые (Oleaceae)

Материал: гербарные образцы облиственных побегов.

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды выданного гербария.

Задание 2. Зарисовать особенности строения листьев и дать описание определенных видов по принятой схеме (см. лабораторную работу 4).

Задание 3. Нанести на контурную карту ареалы изученных видов.

Ключ определения видов семейств Caprifoliaceae, Oleaceae

1. Листья простые.....2
- Листья сложные.....11
2. Листья трехлопастные. Жилкование пальчатое. Черешки листьев короткие с хорошо заметными железками. Имеются нитевидные прилистники.

Калина обыкновенная – *Viburnum opulus*

- Листья цельные.....3
3. Листья яйцевидные или эллиптические, толстые, морщинистые, снизу войлочно-опушенные, по краю зубчатые. Размер листа 8-12 см.

Калина гордовина - *Viburnum lantana*

- Листья цельнокрайние.....4
4. Листья на длинных (более 1-2 см) черешках, крупные, более 8 см длиной.....5
- Листья на коротких (до 0,7 см) черешках, обычно мелкие, до 6 см, редко более.....7
5. Листья широкоэллиптические или продолговато-эллиптические 10-15 см длиной, голые, ясно двуцветные: с верхней стороны зеленые, с нижней серо- или сизо-зеленые.

Сирень венгерская – *Syringa josikaea*

- Листья овальные, яйцевидные, более округлые.....6
6. Листья яйцевидные или широкояйцевидные, при основании полу-сердцевидные или срезанные, плотные, голые, темно-зеленые. Окончание листа вытянутое. Побеги голые, серовато-или зеленовато-бурые.

Сирень обыкновенная – *Syringa vulgaris*

- Листья овальные или яйцевидные, на вершине заостренные, у основания сердцевидные или округлые, голые. Сверху матово-темно-зеленые,

снизу светлее. Побеги красно-бурые с большим количеством белых чечевичек.

Сирень амурская (трескун) – *Syringa amurensis*

– Листья яйцевидные, на вершине резко заостренные, по краю тонкопильчатые, ярко-зеленые, до 7 см длиной. Побеги серовато-желтые.

Форзиция яйцевидная – *Forsythia ovata*

7. Листья овальные или широкояйцевидные, часто с небольшими лопастями, сверху зеленые или синевато-зеленые с округлым или немного суженным основанием. Почка в пазухе листа одиночная.

Снежноягодник белый – *Symphoricarpus albus*

– Почки в пазухе листа сидят обычно по 2-4 одна над другой.....8

8. Верхние листья, сросшиеся основаниями друг с другом, округло-овальные или эллиптические с тупой верхушкой, нижние короткочерешчатые.

Жимолость каприфоль – *Lonicera caprifolium*

– Верхние листья, не сросшиеся своими основаниями.....9

9. Листья яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, с наибольшей шириной у основания, голые, тонкие.

Жимолость татарская – *Lonicera tatarica*

– Листья с наибольшей шириной в середине или около середины листовой пластинки.....10

10. Листья продолговато-эллиптические, сверху темно-зеленые, снизу светлее, голые. Черешки листьев часто сростаются у основания. Молодые побеги, черешки листьев и почки иногда густоволосистые. Побеги красноватые.

Жимолость синяя – *Lonicera coerulea*

– Листья широкоэллиптические, округлые или яйцевидные, сверху тускло-зеленые, снизу зеленовато-серые, опушенные, по краю реснитчатые.

Жимолость обыкновенная – *Lonicera xylosteum*

11. Листья состоят из 5-7 листочков. Листочки яйцевидно-ланцетные, пильчатые. Черешки листьев с двумя железками у основания. Сердцевина побегов рыхлая, бурая.

Бузина красная – *Sambucus racemosa*

– Побеги с плотной сердцевинкой и бурыми или черными почками. Листья плотные.....12

12. Листочков 7-11, снизу в углах жилок и на черешках у них имеются крупные пучки жестких рыжеватых волосков.

Ясень маньчжурский – *Fraxinus mandshurica*

– Листочки снизу без пучков жестких волосков.....13

13. Листочков 11-13, реже 15, они продолговатые, узкоэллиптические или удлинено-обратнояйцевидные с длинным остроконечным, по краю редкопильчатые. Почки черные.

Ясень обыкновенный (высокий) – *Fraxinus excelsior*

– Почки на побегах рыжевато-бурые. Листочки широколанцетные в количестве 5-9 шт.....14

14. Листья светло-зеленые, снизу войлочно-опушенные или опушение лишь по жилкам и черешкам. Побеги округлые, опушенные.

Ясень пенсильванский, пушистый – *Fraxinus pennsylvanica*

– Листья и побеги голые. Побеги сплюснутые у почек. Листочки узкояйцевидные или ланцетные с оттянуто-заостренной вершинкой.

Ясень ланцетный, зеленый – *Fraxinus lanceolata*

Лабораторная работа 12

Определение видов древесных растений по побегам в безлистном состоянии

Материал: гербарные образцы побегов в безлистном состоянии (зимние).

Задание 1. Пользуясь ключом, определить виды, к которым принадлежат предложенные вам побеги в безлистном, зимнем состоянии.

Задание 2. Сделать рисунки побегов. Рисунки должны быть четкими с деталями строения почек, листового рубца и поверхности, побега (чечевички, колючки, шипы, бородавки, железки и т.п.). Отдельно необходимо зарисовать поперечный разрез побега, указав форму сердцевины и ее размеры по отношению к древесине. На каждом рисунке подписать латинское и русское названия растения.

Задание 3. Самостоятельно собрать гербарий побегов 25 видов деревьев в безлистном состоянии.

Собирать для гербария необходимо удлиненные, хорошо развитые побеги с боковыми и верхушечными почками. Нашить собранные побеги на плотный лист бумаги или картона, расположить их в соответствии с систематической принадлежностью: виды объединить в роды, последние в семейства. Указать русское и латинское название растений.

Задание 4. Составить ключ к определению видов собранного гербария и приложить его к гербарию.

**Ключ к определению видов древесных растений по побегам
в безлистном состоянии**

1. Почки супротивные.....2
– Почки очередные.....21
2. Побеги округлые, желтовато-бурые, полые, почки обнаженные, растение вьющееся.

Lonicera caprifolium

- Растения невьющиеся, пряморастущие.....3
3. Почки находятся в центре листового рубца и едва выступают над ним.....4
– Почки свободные и ясно заметные, находятся над листовым рубцом.....5
4. Побеги блестящие, серовато-бурые голые. Почки мелкие, полушаровидные, более или менее ясно выступающие из листовой подушки. Листовой рубец подковообразный с тремя листовыми следами.

Phellodendron amurense

- Почки конусовидные, беловатые, полностью или до половины скрыты под листовым рубцом. Рубцы светлые, ясно выделяющиеся на фоне более темных побегов, треугольные, с тремя следами. Сердцевина белая, широкая.

Philadelphus coronarius

5. Почки обнаженные и состоят из сложенных черешчатых листьев с белым железистым опушением. Побеги светлые, опушенные. Сердцевина белая.

Viburnum lantana

- Почки покрыты (по крайней мере у основания) чешуями.....6
6. Почки покрыты одной, сросшейся из двух чешуек, колпачкообразной чешуйкой. Листовые рубцы трехследные. Побеги желтовато-бурые, ребристые или угловатые.

Viburnum opulus

- Почки покрыты двумя или более несросшимися чешуйками.....7
7. Почки мелкие, 1-2 мм, косо отстоящие, яйцевидно-конические, подпертые остатками листовых черешков. Побеги буровато- или желтовато-серые, голые, тонкобороздчатые, с очень мелкими черными чечевичками. Сердцевина рыжеватая, часто пустая.

Symphoricarpus albus

- Почки более крупные. Сочетание признаков иное.....8
8. Почки имеют сериальное расположение.....9
– Боковые почки одиночные.....11

9. Боковые почки покрыты двумя (иногда четырьмя) наружными чешуями, сильно отстоящие и обычно подпертые листовыми основаниями. Побеги, как и почки, рыжеватые или темно-красно-бурые, голые или волосистые. Сердцевина беловатая.

Lonicera coerulea

– Число чешуй больше 4. Сердцевина побегов буроватая. Побеги часто полые.....10

10. Почки веретеновидные, на верхушке с кисточкой беловатых волосков. Побеги, как и почки, буровато-серые. Сердцевина узенькая, буроватая, часто пустая.

Lonicera xylosteum

– Почки яйцевидно-конические, буроватые, побеги желтовато- или серовато-бурые с мелкими черноватыми чечевичками. Сердцевина бурая, пустая.

Lonicera tatarica

11. Листовые рубцы или их продолжения соприкасаются между собой.....12

– Листовые рубцы не соприкасаются.....17

12. Почки крупные, часто проросшие. Листовые рубцы широкие с пятью следами. Сердцевина рыжая, губчатая. Побеги серые с крупными чечевичками.

Sambucus racemosa

– Листовые рубцы с тремя следами. Сочетание признаков иное13

13. Побеги кораллово-красные, угловатые. Почки двуцветные: чешуи буроватые, черешки красные.

Swida alba

– Побеги и почки иные, листовой рубец сравнительно узкий.....14

14. Почки короткочерешчатые, покрыты двумя, реже четырьмя наружными чешуями, более или менее густо усаженные шелковистыми волосками. Боковые почки прижаты к побегу, длиной 3-7 мм. Побеги оливково-, фиолетово- или буровато-зеленые с легко стирающимся беловатым или сизоватым налетом.

Acer negundo

– Почки сидячие, покрыты обычно более чем четырьмя наружными чешуями.....15

15. Верхушечные почки 6-10 мм длиной, покрыты 6-8 лоснящимися голыми, с короткими беловатыми ресничками по краям чешуями. Боковые почки часто прижаты к побегу 4-6 чешуями буро-красного цвета. Побеги

оливково-бурые или желтовато-зеленые, блестящие, со светлыми полосками и рассеянными чечевичками.

Acer platanoides

– Верхушечные почки короче 5 мм.....16

16. Почки мелкие, до 3 мм длиной. Чешуи почек голые. Побеги тонкие, красновато-бурые, голые, блестящие, с мелкими чечевичками.

Acer ginnala

– Почки до 4 мм длиной. Чешуйки почек с темной каймой по краю, посаженному белыми ресничками. Побеги красно-бурые, слегка ребристые, голые, с многочисленными светлыми чечевичками.

Acer tataricum

17. Побеги округлые или четырехгранные с пробковыми наростами или густо покрытые бурыми бородавками.....18

– Побеги голые или опушенные.....19

18. Побеги округлые, цилиндрические, зеленые, усеянные пробковыми бородавками ржавого, бурого или черного цветов.

Euonymus verrucosa

– Побеги без бородавок, более или менее четырехгранные от пробковых продольных полос, оливковые или темно-зеленые, иногда с красноватый оттенком.

Euonymus europaea

19. Побеги опушенные. Почки рыжеватые, ржаво-серые или бурые. Наружных почечных чешуи две, иногда последние расходятся и за ними видны верхушки второй пары чешуй. Листовой рубец крупный, щитковидной формы со следами, образующими изогнутую линию в виде подковы.

Fraxinus pennsylvanica

– Боковые почки покрыты четырьмя и более чешуйками. Побеги часто оканчиваются двумя конечными почками.....20

20. Побеги оканчиваются двумя верхушечными почками, голые, округлые, желтовато- или зеленовато-серые. Почки голые, зеленоватые или красно-бурые. Листовой рубец узкий с 6-7 следами сосудисто-волокнистых пучков, расположенных в одну линию. Сердцевина рыхлая, белая.

Syringa vulgaris

– Побеги оканчиваются одной верхушечной почкой, чаще с двумя боковыми, округлые, сероватые или буроватые, опушенные короткими темными волосками, с крупными рассеянными чечевичками. Почки бурые, опушенные. Сердцевина белая.

Syringa josikaea

21. Побеги с шипами или колючками.....22
– Побеги без шипов и колючек.....30
22. Побеги с шипами эпидермального происхождения.....23
– Побеги с колючками стеблевого или листового происхождения.....25
23. Побеги и шипы густо опушенные. Побеги буровато-серые или оливковые, густо усажены крепкими шиловидными и тонкими игольчатыми, а также щетинистыми шипами.

Rosa rugosa

- Побеги и шипы без опушения.....24
24. Побеги карминно-красные или фиолетово-красно-бурые. Шипы двоякие: многочисленные тонкие игольчатые или щетинистые и редкие, обычно сидящие по 2 около почек, твердые, изогнутые книзу.

Rosa majalis

- Шипы многочисленные, прямые, игольчатые или шиловидные, горизонтально отстоящие, желтые или желтоватые.

Rosa acicularis

25. Колючки являются видоизмененными листьями или прилистниками.....26
– Колючки стеблевого происхождения.....28
26. Почки обнаженные, окруженные спирально расположенными листовыми подушечками (остатками черешков листьев) и сидящие в пазухах простых или двух-, трех-, пятираздельных сплюснутых колючек. Побеги ребристые.

Berberis vulgaris

- Почки покрыты чешуйками.....27
27. Почки покрыты многочисленными коричневыми или рыжими чешуями, с белым опушением по их краям, сидят над трехраздельными или простыми цилиндрическими 'колючками. Листовой рубец с тремя следами. Побеги круглые, светлые, с мелкими черными точками.

Grossularia reclinata

- Почки сидят в пазухах листовых подушек. Листовой рубец односледный. По краям листового рубца помещаются 2 щетинистые колючки (видоизмененные прилистники). Побеги зеленоватые или темно-зеленые. Древесина зеленоватая.

Caragana arborescens

28. Почки очередные или косопротивные, покрыты медно-красными чешуйками. Колючки длиной до 1,5 см, серого цвета. Листовой рубец односледный.

Hippophaë rhamnoides

– Почки иные.....29

29. Почки крупные, овальные. Побеги и почки голые, блестящие темно-красного или красно-бурого цвета. Листовые рубцы узкие. Колючки крепкие, твердые, до 2-5 см длиной.

Crataegus sanguinea

– Почки яйцевидные, заостренные, темно-серые или бурые. Чешуи почек почти треугольные. Побеги голые, блестящие коричнево-бурые. Чечевички крупные под цвет побега. Боковые побеги часто оканчиваются колючкой.

Pyrus ussuriensis

30. Почки обнаженные, рыжеватые или буровато-войлочные. Побеги вишнево-бурые или пепельно-черные, пестрые от многочисленных светлых чечевичек. Листовой рубец округлый с тремя ясно заметными следами. Сердцевина кремово-коричневая, луб желтый.

Frangula alnus

– Почки покрыты чешуйками.....31

31. Почки покрыты одной колпачкообразной чешуей.....32

– Почки покрыты двумя и более чешуями.....33

32. Побеги толстые, зеленоватые или темно-зеленые, с солнечной стороны красно-бурые. Почки голые, отстоящие, 3-7 мм длиной, килеватые.

Salix caprea

– Побеги ясно волосистые. Почки прижатые, сплюснутые, ланцетные, более или менее густо покрыты беловатыми шелковистыми волосками.

Salix alba

33. Почки черешчатые, чешуйки не доходят до основания почек.....34

– Почки сидячие.....35

34. Побеги густо опушенные, бурые или красновато-бурые. Почки 8-15 мм, параллельные побегу или чаще от него отстоящие и несколько отогнутые, тупые с редкими восковыми струпами или без них, неклеящие.

Alnus incana

– Побеги усеяны (иногда только в верхней части) янтарно-желтыми железками, желтовато-серые. Почки 4-10 мм длиной, светлые, бледно-

зеленые, иногда с красноватым оттенком, по краям чешуи длинные белые реснички. Как и побеги, почки покрыты железками.

Ribes nigrum

35. Побеги толстые, зеленовато-бурые, войлочно-опушенные. Над листовым рубцом войлочный валик. Сердцевина побега не сплошная, а состоит из тонких поперечных пластинок.

Juglans mandshurica

– Сочетание признаков иное.....36

36. Почки рыхлые, чешуи более или менее оттопыренные, видна серовойлочная верхушка внутренней части почки. Листовой рубец с тремя следами, видимыми лишь на срезе. Побеги серовато-бурые, к вершине опушенные.

Cotoneaster lucidus

– Чешуи почек сомкнутые, сочетание признаков иное.....37

37. Сердцевина побегов на поперечном срезе ясно пятилучевая или пятиугольная.....38

– Сердцевина иной формы.....39

38. Почки плотно покрыты многочисленными чешуйками, у вершины побега расположены скученно. Листовой рубец полукруглый с тремя группами следов. Побеги бурые с многочисленными чечевичками, угловатые.

Quercus robur

– Чешуи почек блестящие, буроватые. Листовые почки удлинено-яйцевидные, острые. Побеги темные, от оливково- до каштаново-бурых, голые.

Populus tremula

39. Почки мелкие, не длиннее 4 мм.....40

– Почки более крупные.....43

40. Почки и побеги покрыты буровато-бронзовыми или медно-бронзовыми чешуйками.....41

– Почки и побеги голые или с серебристым опушением.....42

41. Почки и побеги буровато-бронзовые.

Elaeagnus argentea

– Почки медно-бронзовые с желобком посередине. Побеги серые. Укороченные побеги часто оканчиваются колючкой.

Hippophaë rhamnoides

42. Побеги тонкие, зеленые, буроватые или с фиолетовым оттенком, так же, как и почки, с серебристым опушением. Почки в пазухе остающегося листового черешка.

Chamaecytisus ruthenicus

– Побеги продольно-ребристые, желто-бурые, со следами опушения и с мелкими темными чечевичками. На вершине побегов засохшие части метелковидных соцветий.

Spiraea salicifolia

43. Побеги с широкой, рыхлой сердцевинной, которая часто по ширине превосходит древесину.....44

– Сердцевина побегов узкая, плотная.....45

44. Побеги толстые, 5-10 мм в диаметре, серые или коричневатосерые, коленчатые, усеянные чечевичками. Листовой рубец крупный с тремя следами. Почки толстые, зеленые с бурыми чешуями у основания. Боковые почки обычно с двумя добавочными почками по бокам.

Sorbaria sorbifolia

– Побеги более тонкие, 3-5 мм в диаметре, коричневые продольно-ребристые с отслаивающейся тонкими длинными пластинками корой. Почки продолговато-яйцевидные, бурые. Боковые почки в пазухах листовых подушек.

Physocarpus opulifolius

45. Побеги желтовато-зеленые, бурые, с солнечной стороны темнее, голые, с чечевичками. Почки 4-8 мм длиной, неравнобокие (кособокие) из-за сильно выпуклой нижней чешуйки, овальные, тупые, от желтоватозеленых до буро-карминных.

Tilia cordata

– Почки некособокие. Выпуклых чешуй у основания почек нет.....46

46. Побеги блестящие, красновато-бурые, часто густобородавчатые. Сердцевина побега зеленая, неправильно треугольная. Почки яйцевидноконические, 4-7 мм длиной. Чешуи почек красновато-бурые.

Betula pendula

– Сочетание признаков иное.....47

47. Почки располагаются двурядно (по двум сторонам побега) Побеги красновато- или желтовато-бурые. Почки острые, конические, 5-7 мм длиной. Чешуйки почек светло-коричневые с темно-бурым краем, реснитчатые. Листовой рубец с тремя следами.

Ulmus laevis

– Расположение почек спиральное.....48

48. Побеги с овальными или продолговатыми трещинами, буроватые, с железистыми волосками. Сердцевина побега рыжеватого цвета. Почки тупойцевидные или почти округлые, 4-6 мм длиной.

Coryllus avellana

– Почки заостренные, более крупные.....49

49. Побеги опушенные, зеленовато-бурые с железками и чечевичками. Почки узкокониические, заостренные, прижатые к побегу, красновато-коричневые, у основания почки яркая красноватая полоска.

Aronia melanocarpa

– Побеги голые.....50

50. Побеги толстые, более 3 мм в толщину, покрытые блестящей сероватой пленкой. Чечевички рыжеватые. Листовой рубец узкий, с пятью следами, из которых снаружи иногда видны только 3. Почки черновато-бурые, 8-15 мм длиной, мохнатоопушенные, часто изогнутые.

Sorbus aucuparia

– Побеги красно-бурые или зеленовато-бурые, с многочисленными светлыми чечевичками, с характерным острым запахом. Почки удлинено-конусовидные, пёстрые, 7-13 мм длиной. Листовой рубец большой, почковидный с тремя следами.

Padus avium