Научная статья
УДК 57.085.23

**ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
РОСЯНКИ АНГЛИЙСКОЙ (*DROSERA ANGLICA* HUDS.) ИЗ ЛИСТА**

Анна Александровна Шевелева¹, Ольга Николаевна Ситникова²

^{1,2} Костромской государственной университет, Кострома, Россия

¹ zarapkachy-chy@mail.ru

² sitnikova.olga1989@yandex.ru

Аннотация. *Drosera anglica* Huds. является краснокнижным растением с низкой устойчивостью к изменениям окружающей среды. Одним из путей восстановления популяции является микроклональное размножение, которое позволяет сохранить видовые признаки.

Ключевые слова: *Drosera anglica*, Росянка английская, микроклонирование растений, биотехнология

Для цитирования: Шевелева А. А., Ситникова О. Н. Технология микроклонального размножения росянки английской (*Drosera Anglica* Huds.) из листа // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России = Scientific creativity of youth to the forest complex of Russia : материалы XXI Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. Екатеринбург : УГЛТУ, 2025. С. 459–462.

Original article

**TECHNOLOGY OF MICROCLONAL SPREADING OF ENGLISH DEW
(*DROSERA ANGLICA* HUDS.) FROM A LEAF**

Anna A. Sheveleva¹, Olga N. Sitnikova²

^{1,2} Kostroma State University, Kostroma, Russia

¹ zarapkachy-chy@mail.ru

² sitnikova.olga1989@yandex.ru

Abstract. *Drosera anglica* Huds. It is a red book plant with low resistance to environmental changes. One of the methods of population restoration is the microclonal reproduction of *D. anglica*, which preserves the species characteristics of the plant.

Keywords: *Drosera anglica*, Rosyanka anglijskaya, mikroklonirovanie rastenij, biotexnologiya

For citation: Sheveleva A. A., Sitnikova O. N. (2025) *Texnologiya mikroklonal'nogo razmnozheniya Rosyanki Anglijskoj (Drosera Anglica Huds.) iz lista [Technology of microclonal spreading of English Dew (Drosera Anglica Huds.) from a leaf]. Nauchnoe tvorchestvo molodezhi – lesnomu kompleksu Russia] : proceedings XXI Vserossijskoj (nacional'noj) nauchno-texnicheskoj konferencii studentov i aspirantov. Ekaterinburg : UGLTU, 2025. P. 459–462. (In Russ).*

Drosera anglica Huds. является хищным растением с длинночерешковыми ланцетными листьями, на окончаниях которых находятся волоски, содержащие специальную вязкую жидкость [1]. Данный вид обитает на верховых болотах, предпочитает более влажные условия и продолжительный световой день, в отличие от других представителей этого рода. В роли растений-спутников часто выступают такие виды, как пушница (*Eriophorum* sp.), клюква (*Vaccinium* sp.), сфагнум (*Carex limosa*, *Oxycoccus palustris*, *Rubus chamaemorus*) [2]. При этом другие виды сфагнума (*Carex limosa*, *Oxycoccus palustris*, *Rubus chamaemorus*) пагубно влияют на *D. anglica*, вытесняя ее с мочажник [3].

Данный вид внесен в красную книгу не только Костромской области, но и Московской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Владимирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Курганской области, а также в Европе, Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке, Монголии, Северной Америке. Эти данные говорят о важности сохранения этого вида, т. к. популяция *D. anglica* уменьшается не только в одной области или стране, а на других континентах. Поскольку *D. anglica* является плотоядной, то, в отличие от других растений, может преобразовывать органический азот в неорганический и запасать его в корнях, отдавая часть азотных соединений в почву, тем самым удобряя ее. Вследствие обогащения почвы происходит акклиматизация других видов растений, которые предпочитают более насыщенный азотом субстрат.

Для восстановления *D. anglica* используется технология микроклонального размножения, которая позволяет сохранить видовые признаки [4].

Целью наших исследований являлось выполнение технологических условий по микроклональному размножению, учитывая особенности вида. Кроме того, необходимо было определить, из какой части листа – срединной или верхушечной – лучше брать материал для микроклонирования. Эксперимент был проведен в 2024 г. на базе лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО «Костромского государственного университета». В качестве материала были взяты длинные листья *D. anglica* 3–4 см, срезанные острым скальпелем.

За основу исследования была взята методика О. Е. Коваль и А. С. Пьянова, в котором проводился подбор среды для *D. anglica* [4].

Таким образом, в нашем исследовании была использована среда Мурасиге-Скуга (MS) с уменьшенным содержанием макроэлементов на $\frac{1}{2}$

часть, поскольку эта технология позволяет произвести эффективный рост данного вида из листа.

Согласно работам Н. А. Березина, была установлена повышенная чувствительность *D. anglica* к различным химическим веществам. Поэтому методику стерилизации изменили, уменьшив время обработки в гипохлорите до 8 мин. вместо стандартных 15 мин. Были проведены этапы стерилизации листьев *D. anglica*, в следующем порядке:

- 1) 5 мин. в спирте;
- 2) 8 мин. в гипохлорите;
- 3) 1 мин. непрерывно мешая, после 5 мин в стерильной воде;
- 4) 5 мин. в стерильной воде.

На каждом этапе встряхивали емкость для полного очищения листьев от веществ и инородных частиц (пыли, частиц растений и т. д.).

После проведенных манипуляций лист разделили на три равные части по 0,5 см, при этом отрезали место среза листа, которое отмирало во время стерилизации и становилось черным. После чего части *D. anglica* местом среза погружали в среду [5].

Через 46 дней (19.07.2024–03.09.2024) развился каллус у частей, которые были взяты с середины листа (рис. 1).

Рис. 1. Ювенильное растение из верхушечной части листа *D. anglica*

Верхняя же часть листа дала результат только спустя 56 сут. (19.07.2024–13.09.2024), при этом из места среза образовалось два побега (рис. 2).

Рис. 2. Каллус из срединной части листа *D. anglica*

Таким образом, можно заключить, что срединные части листа образуют каллус, который можно использовать для дальнейшего микроклонального размножения *D. anglica*. Верхушечные части образуют полноценные ювенальные растения, которые можно развить *in vitro* и в дальнейшем адаптировать к почвенной среде.

Список источников

1. Чугунов Г. Г. Растения-хищники // Мордовский заповедник. 2012. № 2. С. 32–34. EDN PKIMCH.
2. Березина Н. А., Лисс О. Л. Тайны мира зеленого безмолвия // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 3(81). С. 163–167. EDN KNVRUN.
3. Борисова Е. А. Рослянка английская (*Drosera anglica* Huds.) в Ивановской области: современное состояние популяций, проблемы охраны // Материалы X международной конференции по экологической морфологии растений, посвященной памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых, Москва, 27–30 ноября 2019 года. М. : Московский педагогический государственный университет, 2019. С. 95–100. EDN ZVINUD.
4. Коваль О. Е., Пьянова А. С. Оптимизация протокола микроклонального размножения *Drosera anglica* Huds // Сборник тезисов 26-ой Пущинской школы-конференции молодых ученых. Пущино : Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук, 2023. С. 292–293. EDN KRCBDF.
5. Азарова О. П., Чачина С. Б. Основы биотехнологии : учебно-методическое пособие. Омск : Омский государственный университет, 2008. С. 28–29.